CARACTERIZACIÓN GENERAL DE HÁBITATS Y MONITOREO DE FAUNA
Áreas Arroyo Capilla Vieja y Reserva Blanqueal
PREDIO “Piedras Coloradas”
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias
(Depto. Paysandú)



Reserva Blanqueal



Áreas Arroyo Capilla Vieja

Setiembre 2026


Autor: Lic. Raúl Lombardi

Introducción

El presente informe es el resultado de los estudios de caracterización de hábitats y relevamiento de fauna tetrápoda terrestre: Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos, desarrollados en el mes de setiembre.

Localización

Los predios se ubican en la localidad de Piedras Coloradas, Depto de Paysandú. Se accede a los mismos desde ruta 90 y caminería hacia el sur y hacia el norte.







Localizacion nacional, regional y local de los predios y las áreas de estudio (puntos amarillos) en base a visualizador Geoportal OAN- Ministerio de Ambiente 2026

Zona de influencia

Las áreas de estudio se ubican en la región paisajística correspondiente a las praderas del noroeste del territorio nacional. La misma presenta un paisaje suavemente ondulado siendo la matriz dominante la pradera natural en la cual predominan diferentes especies de gramíneas de varios géneros como *Aristida* sp., *Stipa* sp. *Paspalum spp*. *Andropogon* sp.
Los principales cursos de agua presentes en la zona de influencia son el río Uruguay por el oeste, el río Queguay por el norte y el arroyo Negro por el sur. Asociados a éstos, ocurren bosques ribereños siendo éstos importantes corredores biológicos.

El área de estudio sobre Arroyo Capilla Vieja se encuentra a menos de 10 km. del "Área protegida de recursos manejados Montes del Queguay" del Sistema Nacional de Áreas protegidas SNAP.




"Área protegida de recursos manejados Montes del Queguay" y Área adyacente del Sistema Nacional de Áreas protegidas SNAP en base a Visualizador Geoportal OAN- Ministerio de Ambiente 2026

Según el sistema de información ambiental Geoportal OAN-Ministerio de Ambiente, la zona de estudio Arroyo Capilla Vieja, se encuentra afectada por la celda N 15 sitios SNAP Clase 5 “Articulación con otras estrategias de conservación”



Celda N15 Clase 5 “Articulación con otras estrategias de conservación” en base a Visualizador Geoportal OAN-Ministerio de Ambiente 2026

A su vez, las áreas de estudio presentan ecosistemas “vulnerables” según el sistema de información ambiental en base a Visualizador Geoportal OAN- Ministerio de Ambiente 2026



Áreas de ecosistemas vulnerables en las zona de estudio Arroyo Capilla Vieja (sector superior derecho) y Reserva Blanqueal (sector inferior) según visualizador Visualizador Geoportal OAN- Ministerio de Ambiente 2026

En relación a las áreas de conservación, la zona de influencia forma parte de la IBA 009 (Important Bird Areas, IBAs) que han sido definidas para Uruguay por el programa IBA de Birdlife Internacional.



Área IBA 009 en base a Visualizador Geoportal OAN- Ministerio de Ambiente 2026

Metodología

Se realizó un relevamiento básico de información sobre acceso a los predios y autorización para su ingreso con personal de la empresa. Se analizaron las cartografías brindadas por la empresa, así como las imágenes satelitales disponibles en el Visualizador del Sistema de información ambiental del Ministerio de ambiente. En base a esta información, se elaboró una zonificación inicial incluyendo, áreas forestadas, manchas de vegetación nativa, corredores biológicos y áreas naturales relevantes y a conservar. In situ se relevaron y fotografiaron las principales unidades del paisaje. Se caracterizó el hábitat en base a los principales rasgos fisonómicos de la vegetación y comunidades vegetales.

Las visitas al área de estudio se realizaron en el mes de setiembre, dedicándose unas 17 horas/hombre efectivas de observación y registro.

Para el relevamiento de aves se realizaron recorridos a pie y en vehículo. Los registros se efectuaron en base a avistamientos directos y a la identificación de vocalizaciones. Para el relevamiento de anfibios se realizaron relevamientos mediante registro sonoro de vocalizaciones y por búsqueda activa de individuos. Para reptiles se realizó búsqueda bajo piedras y otros refugios criptozoicos. Para mamíferos se realizó búsqueda activa y se relevaron rastros y huellas.

Se elaboraron listas de especies incluyendo su categorización según listados internacionales de conservación (UICN, CITES) y a nivel nacional en base a criterio del autor y a la Guía de Fauna y Flora de Uruguay (Geymonat G. & Lombardi R., 2018), lista de EPC (Especies de Prioridad de Conservación- SNAP) y según la base de datos de invasiones biológicas para Uruguay (InBUy).

Se aplicaron las siguientes categorías en concordancia con la categorización de:
- Criterio de autor y Geymonat G. & Lombardi R., 2018, Fauna y Flora de Uruguay. Bosques y ambientes cercanos.766 pp. Categorías: Muy abundante, Abundante, Común, Poco Común, Escaso, Raro, Probablemente extinto en Uruguay, Extinto en Uruguay.
- Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la cual divide las especies en nueve categorías: No Evaluado, Datos Insuficientes, Preocupación Menor, Casi Amenazado, Vulnerable, En Peligro, En Peligro Crítico, Extinto en Estado Silvestre y Extinto. https://www.iucnredlist.org/es
- Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Apéndices I, II y III, siendo las especies en el apéndice I las que tienen el mayor grado de peligro de extinción. https://cites.org/esp/app/appendices.php
- ESPECIES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN (EPC), especies con prioridad para la conservación en Uruguay, según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

En la Clase se estimó la riqueza de especies mediante el índice Chao 1 y se aplicó el índice de diversidad de Margalef.

Resultados

CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT

Los predios presentan un paisaje suavemente ondulado, siendo la pradera la matriz inicial. Ocurren cursos de agua algunos de ellos asociados a bosques ribereños. También ocurren algunos afloramientos rocosos en zonas altas, blanqueales y cultivos forestales de Pinos (*Pinus* sp.) y Eucaliptos (*Eucalyptus* sp.).

Ambientes asociados al arroyo Capilla Vieja


Las praderas naturales presentes están constituídas principalmente por diferentes especies de gramíneas, de varios géneros como *Aristida* sp., *Stipa* sp. *Paspalum sp*. y *Andropogon* sp.
Los bosques nativos presentes se caracterizan por ser de porte bajo, con régimen tallar, observándose también ejemplares con régimen fustal maduro en el área de estudio. Las especies dominantes son Espinillos (*Acacia caven*) y Molles (*Schinus* spp.). Ocurren tambien Guayabos colorados (*Myrcianthes cisplatensis),* Coronillas (*Scutia buxifolia*), Arueras (*Lithraea brasiliensis*) y especies de los géneros Baccharis y Chilcas (*Acanthostyles buniifolius).*
En algunos sectores y sitios puntuales ocurren especies vegetales exóticas invasoras como Álamos (*Populus* sp.), Paraísos (*Melia azedarach*) y Corona de Cristo (*Gleditsia triacanthos*).
Las áreas de cultivo consisten en amplias manchas de vegetación implantada conformada por cultivos maduros de Eucaliptos y Pinos (efecto barrera alto).



Vista panorámica de la zona de muestreo.

Área de reserva de Blanqueal

El área protegida establecida se sitúa en el extremo sur del predio. Presenta zonas de bosque de parque con blanqueales. siendo las especies dominantes Palma Caranday (*Trithrinax campestris*), Quebracho Blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) con abundante regeneración y Ñandubay (*Neltuma affinis*). Tambien ocurren especies como Zarzaparilla (*Smilax campestris*) y Cedrón del monte (*Aloysia gratissima*).



Vista panorámica Área de reserva de Blanqueal

En términos generales, las características fisonómicas en la vegetación y la composición florística de los predios presentaron características similares en relación al relevamiento anterior.
En el área de reserva de Blanqueal se observó en algunos sectores, un tapiz vegetal de bajo porte y suelo con baja cobertura.
En relación al palmar de Caranday presente en dicha área, se identificaron algunos ejemplares secos o parcialmente secos.



Imágenes de algunos ejemplares de Caranday (*Trithrinax campestris*) secos o parcialmente secos

FAUNA

Se registró un total de 75 especies, correspondiendo a 1 especie de reptiles, 2 de anfibios, 67 de aves y 5 especies de mamíferos, incluyendo la especie exótica invasora Jabalí *Sus scrofa*.

En relación a indicadores la diversidad biológica basada en la Clase aves, surgen los siguientes resultados:

- Riqueza de especies observada: 67
- Riqueza Estimada por Chao 1 (S 1) = S obs. + (a2 / 2b) = 67 + (144/30) = 71,8
- Indice de Margalef (d) = (S -1)/log N = (67-1) / ln 255 = 66 / 5.54 = 11,91

En cuanto al estado de conservación se registró:

- Especies consideradas “Poco Común” para nuestro país: 1 especie

Águila Colorada *Heterospizias meridionalis*

- Especies consideradas prioritarias para la conservación EPC según el Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP): 7 especies

Ñandú *Rhea americana*
Perdiz *Nothura maculosa*
Cardenal Copete Rojo *Paroaria coronata*
Mulita *Dasypus hybridus*
Carpincho *Hydrochoerus hydrochoeris*
Nutria *Myocator coypus*
Zorro Perro *Cerdocyon thous*

- Especies UICN

“Cercanas a la amenaza”: 2 especies

Ñandú *Rhea americana*
Mulita *Dasypus hybridus*

“Susceptibles” 3 especies

Carpincho *Hydrochoerus hydrochoeris*
Zorro Perro *Cerdocyon thous*
Mulita *Dasypus hybridus*

- Especies exóticas invasoras: 1 especie

Jabalí *Sus scrofa*

Análisis de los datos relevados

En el presente relevamiento, la composición faunística de los ambientes estudiados mantiene los valores de riqueza y abundancia en medio-alto, sin variaciones significativas respecto al estudio anterior.

El índice de diversidad de Margalef (D) para el grupo de las aves arroja un valor de 11, 91 (11,82 en el estudio anterior). Este resultado se sitúa en la franja de niveles «altos» y se mantiene en la misma categoría que en el estudio anterior.

Listado de especies registradas

ANFIBIOS							
ORDEN	**Registro**	**UICN REGIONAL**	**Especies Prioritarias para la**	**UICN GLOGAL**	**CITES**	**Número de**	**Número de**
Famila	**en**		**Conservacion (EPC)**			**especies**	**individuos**
Nombre Común	**Uruguay**					**registradas**	**registrados**
Nombre cientifico							
Hylidae							
Rana Boyadora Grande							
Pseudis minutus	Muy abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	7
Leiuperidae							
Macaquito							
Pseudopaludicola falcipes	Muy abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	13
Totales						2	20

REPTILES							
ORDEN	**Registro**	**UICN REGIONAL**	**Especies Prioritarias para la**	**UICN GLOGAL**	**CITES**	**Número de**	**Número de**
Famila	**en**		**Conservacion (EPC)**			**especies**	**individuos**
Nombre Común	**Uruguay**					**registradas**	**registrados**
Nombre cientifico							
Chelidae							
Morrocoyo							
Trachemys dorbigni	Abundante	No evaluada (NE)		No evaluada (NE)		1	1
TOTAL						1	1

AVES

ORDEN	Uso	Ocurrencia	Registro	UICN REGIONAL	Especies Prioritarias para la	UICN GLOGAL	CITES	Número de
Famila	de	en	en		Conservacion (EPC)			especies
Nombre Común	Hábitats	Uruguay	Uruguay					registradas
Nombre cientifico								
RHEIFORMES								
Rehidae								
Ñandú								
Rhea americana	P	RN	Común	Preocupación menor (LC)	**EPC**	Casi amenazado (NT)	II	**1**
TINAMIFORMES								
Tinamidae								
Perdiz								
Nothura maculosa	P	RN	Muy abundante	Preocupación menor (LC)	**EPC**	Preocupación menor (LC)		1
PELECANIFORMES								
Phalacrocoracidae								
Biguá								
Phalacrocorax brasilianus	A C	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
CICONIFORMES								
Ardeidae								
Garza Bruja								
Nycticorax nycticorax	A B	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
Garza Amarilla								
Syrigma s. sibilatrix	P A	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
Garza Blanca Grande								
Ardea alba	A	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
Garza Mora								
Ardea cocoi	A	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
Ciconiidae								
Cigüeña Común								
Ciconia maguari	A P	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
Threskiornithidae								
Bandurria Mora								
Harpiprion caerulescens	A P B	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
Cuervillo de Cañada								
Plegadis chihi	A	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
ANSERIFORMES								
Anhimidae								
Chajá								
Chauna torquata	A P	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
Anatidae								
Pato Brasilero								
Amazonetta brasiliensis	A	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
Pato barcino								
Anas f. flavirostris	A	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1
CATHARTIFORMES								
Cathartidae								
Cuervo de Cabeza Roja								
Cathartes aura ruficollis	B P M	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1

ACCIPITRIFORMES									
Accipitridae									
Gavilán Común									
Rupornis magnirostris	P B M A E H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)	II	1	3
Águila Colorada									
Heterospizias meridionalis	P M A E	RN	Poco Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)	II	1	1
FALCONIFORMES									
Falconidae									
Carancho									
Caracara plancus	M P E H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)	II	1	5
Chimango									
Milvago chimango	P M E H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)	II	1	1
Halconcito común									
Falco sparverius	M P B H E	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)	II	1	3
GALLIFORMES									
Cracidae									
Pava de Monte									
Penelope obscura	B	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
GRUIFORMES									
Rallidae									
Gallineta Grande									
Aramides ypecaha	A E M P	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	2
Polla de Agua									
Gallinula chloropus	A	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
Gallineta Común									
Pardirallus sanguinolentus	A	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	2
CHARADRIIFORMES									
Charadriidae									
Tero									
Vanellus chilensis	P	RN	Muy abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	9
Jacanidae									
Jacana									
Jacana jacana	A	RN	Comun	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
COLUMBIFORMES									
Columbidae									
Paloma Picazuro									
Patagioenas picazuro	B M P E H	RN	Muy abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	8
Torcaza									
Zenaida auriculata	B M P E H	RN	Muy abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	11
Paloma Montaraz Común									
Leptotila verreauxi	P M	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
Torcacita Común									
Columbina p picui	B M P E H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	7
Paloma Ala Manchada									
Patagioenas maculosa	B M P E H	RN	Muy abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	6
PSITTACIFORMES									
Psittacidae									
Cotorra									
Myiopsitta monachus	B H E P	RN	Muy abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)	II	1	17

CUCULIFORMES									
Cuculidae									
Pirincho									
Guira guira	B M P E H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	8
APODIFORMES									
Trochilidae									
Picaflor Bronceado									
Hylocharis chrysura	B E H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)	II	1	2
Picaflor Garganta Blanca									
Leucochloris albicollis	B E H	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)	II	1	1
CORACIIFORMES									
Alcedinidae									
Martin Pescador Chico									
Chloroceryle americana	AB	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	1
Martín Pescador Grande									
Megaceryle torquata	A B	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	1
PICIFORMES									
Picidae									
Carpintero de campo									
Colaptes campestris	M P E H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	6
Carpintero Nuca Roja									
Colaptes melanochloros	B M E H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	4
PASSERIFORMES									
Furnaridae									
Trepador Grande									
Drymornis bridgesii	B H	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
Trepador Chico									
Lepidocolaptes angustirostris	B H	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	1
Trepadorcito									
Cranioleuca pyrrhophia	B E M H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
Hornero									
Furnarius r. rufus	P M E H	RN	Muy abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	9
Pijuí Común									
Synallaxis spixi	E M	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	2
Tio-tio Común									
Phacellodomus striaticollis	M E A	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	2
Espinero									
Anumbius a. annumbi	E M	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	1
Tyrannidae									
Viudita Negra Común									
Knipolegus cyanirostris	B E	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	1
Tiquitiqui Común									
Serpophaga subcristata	B M E H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
Escarchero									
Xolmis cinerea	P PB	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
Viudita Blanca Común									
Xolmis i. irupero	P B	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	1
Margarita									
Machetornis r. rixosus	P E H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	2
Benteveo									
Pitangus sulphuratus	B P E M H A	RN	Muy abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	7

Troglodytae									
Ratonera									
Troglodytes aedon	B P E M H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	2
Mimidae									
Calandria									
Mimus saturninus	B P E M H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	8
Turdidae									
Sabiá									
Turdus amaurochalinus	B E M H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
Zorzal									
Turdus r. rufiventris	B E M H	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	5
Polioptilidae									
Tacuarita Azul									
Polioptila d. dumicola	B E M	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
Emberizidae									
Chingolo									
Zonotrichia capensis	B P E M H A	RN	Muy abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	23
Thraupidae									
Dorado									
Sicalis flaveola	P M	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	4
Cardenal Copete Rojo									
Paroaria coronata	B P E M H	RN	Común	Preocupación menor (LC)	**EPC**	Preocupación menor (LC)	II	1	3
Verdón									
Embernaga p. platensis	P M	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	2
Naranjero									
Thraupis bonariensis	B E H	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	1
Parulidae									
Pitiayumí									
Setophaga pitiayumi	B E	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	2
Vireonidae									
Juan Chiviro									
Cyclarhis gujanensis	B E	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
Icteridae									
Pecho amarillo									
Pseudoleistes virescens	P A	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	4
Tordo común									
Molothrus bonariensis	B E M H P	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	5
Músico									
Molothrus b. badius	B E M P	RN	Abundante	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	5
Fringilidae									
Cabecitanegra									
Sporagra magellanica	E M P	RN	Común	Preocupación menor (LC)		Preocupación menor (LC)		1	3
TOTAL								67	255

MAMÍFEROS									
ORDEN Famila Nombre Común	Uso de Hábitats	Ocurrencia en Uruguay	Registro en Uruguay	González,E.M.& J.A.Martínez-Lanfranco, 2010	Especies Prioritarias para la Conservacion (EPC)	UICN GLOGAL	CITES	Número de especies registradas	Número de individuos registrados
CINGULATA									
Dasypodidae									
Mulita									
Dasypus hybridus	P E M	RN	Abundante	Susceptible (SU)	**EPC**	Casi amenazado (NT)		1	1
RODENTIA									
Caviidae									
Carpincho									
Hydrochoerus hydrochoeris	A B E	RN	Común	Susceptible (SU)	**EPC**	Preocupación menor (LC)		1	2
Myocastoridae									
Nutria									
Myocator coypus	A	RN	Común	No amenazada (NA)	**EPC**	Preocupación menor (LC)		1	1
CARNIVORA									
Canidae									
Zorro Perro									
Cerdocyon thous	B E M	RN	Común	Susceptible (SU)	**EPC**	Preocupación menor (LC)	II	1	1
ARTIODACTYLA									
Suidae									
Jabali									
Sus scrofa	E M B A P	EXO IN	Abundante	No amenazada (NA) - Plaga		Preocupación menor (LC)		1	2
TOTAL								5	7

Referencias

Hábitats
P : Pradera
M: Matorral
B: Bosque
A: Ambientes acuáticos
E: Ecotonos
H: Areas antropizadas
C: Costas

Status de Conservación UICN	
	Preocupación Menor (LC)
	Casi Amenzada (NT)
	Vulnerable (VU)

Registro en Uruguay Fauna y Flora de Uruguay. Bosques y ambientes cercanos. (Geymonat G & R. Lombardi 2018)	
	Muy abundante
	Abundante
	Comun
	Poco comun
	Escasa
	Rara

Status de Conservación de los mamíferos en Uruguay (González,E.M.& J.A.Martínez-Lanfranco, 2010)	
	No evaluada (NE)
	No amenazada (NA)
	Susceptible (SU)
	Vulnerable (VU)
	Muy Vulnerable (MVU)
	Amenazado (AM)

CITES	I	Especies que están en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies
	II	.Especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio
	III	Especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES para controlar su comercio.

Imágenes de algunas especies de fauna relevadas








Ñandú *Rhea americana,* Pato Brasilero *Amazonetta brasiliensis,*Bandurria Mora *Harpiprion caerulescens,* Garza Amarilla *Syrigma s. sibilatrix,* Gavilán Común *Rupornis magnirostris* , Nutria *Myocator coypus*

Conclusiones

Las características fisonómicas en la vegetación y la composición florística de las áreas presentaron características similares en relación al relevamiento anterior.

En el área de reserva de Blanqueal se observó en algunos sectores, un tapiz vegetal de bajo porte y suelo con baja cobertura.

En relación al palmar de Caranday presente en dicha área, se identificaron algunos ejemplares secos o parcialmente secos.

La composición faunística de los ambientes estudiados presentó niveles de riqueza y abundancia medio – alto, similares al relevamiento anterior.

El índice de diversidad de Margalef (D) para el grupo de las aves muestra un valor de 11,91. Este resultado se sitúa en la franja de niveles “altos” y se mantiene en la misma categoría que en el estudio anterior.

Consideraciones

Evaluar el estado fitosanitario del Palmar de Caranday

Establecer un monitoreo anual para la evaluación de la dinámica poblacional del Palmar de Caranday

A partir de la próxima cosecha, evaluar un cambio del uso forestal del área al sur de la reserva blanqueal a áreas de restablecimiento de ambientes naturales, permitiendo la conexión del área de reserva con ambientes naturales de la zona.

Continuar con el plan de vigilancia y control de especies vegetales exóticas invasoras.

Continuar con los relevamientos y monitoreos de fauna en época cálida.

Bibliografía

Achaval F., Olmos A., (2003): Anfibios y Reptiles del Uruguay.

Achaval F., Clara M. y Olmos A. (2007): Mamíferos de la República Oriental del Uruguay.

Azpiroz AB (2001): Aves del Uruguay. Lista e introducción a su biología y conservación. Aves Uruguay-gupeca, Montevideo. 104 pp.

Azpiroz, A. B. (2012): Aves de las Pampas y Campos de Argentina, Brasil y Uruguay. Una guía de identificación.

Azpiroz AB, M Alfaro & S Jiménez (2012): Lista roja de las aves del Uruguay. Una evaluación del estado de conservación de la avifauna nacional con base en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. DINAMA. 82 pp.

Carreira S, M Meneghel & F Achaval (2005): Reptiles de Uruguay. Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo. 639 pp.

Carreira S & R Maneyro (2013): Guía de Reptiles del Uruguay. Ediciones de la Fuga. Montevideo. 285 pp.

Carreira, S. & R. Maneyro. (2015). Lista Roja de los Anfibios y Reptiles del Uruguay. Una evaluación del estado de conservación de la herpetofauna de Uruguay sobre la base de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dirección Nacional de Medio Ambiente, Montevideo.

Geymonat G. & Lombardi R., (2018). Fauna y Flora de Uruguay. Bosques y ambientes cercanos.766 pp

González E & JA Martínez-Lanfranco (2010). Mamíferos de Uruguay. Guía de campo e introducción a su estudio y conservación. Vida Silvestre - Museo Nacional de Historia Natural. Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 463 pp.

Lombardi R. (2023). Caracterización general de hábitats y monitoreo de fauna Áreas Arroyo Capilla Vieja y Reserva Blanqueal Predio “Piedras Coloradas” Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias

Lombardi R, Geymonat G. y Berrini R. (2015). El Jabalí en el Uruguay, problema, desafío y oportunidad.

Maneyro R., Carreira S., (2012). Guía de Anfibios del Uruguay.

Narosky T., Yzurieta D. (1993): Aves de Argentina y Uruguay, Guía para la identificación. Lic. Raúl Lombardi

Soutullo A, C Clavijo & JA Martínez-Lanfranco (eds.). (2013) Especies prioritarias para la conservación en Uruguay. Vertebrados, moluscos continentales y plantas vasculares. SNAP/DINAMA/MVOTMA y DICYT/MEC, Montevideo.

Sitios WEB

https://www.ambiente.gub.uy/visualizador/index.php?vis=sig

http://www.cites.org/esp

http://www.iucnredlist.org/